

Disfunción orgánica en pacientes pediátricos con leucemia linfoide aguda en el Instituto de Hematología e Inmunología

Anexo 2

Escala SOFA (*Sepsis-related Organ Failure Assessment*)

	0	1	2	3	4
Respiración					
PaO ₂ /FiO ₂ (mmHg) o SaO ₂ /FiO ₂	> 400	<400 221- 300	<300 142-220	<200 67-141	<100 <67
Coagulación	>150	<150	<100	<50	<20
Plaquetas (10 ³ /mm ³)					
Hígado	<1,2	1,2-1,9	2,0-5,9	6,0-11,9	>12
Bilirrubina (mg/dL)					
Cardiovascular	PAM≥70 mmHg	PAM<70 mmHg	Dopamina en dosis < 5 o dobutamina en cualquier dosis	Dopamina en dosis 5,1 a 15 o epinefrina, ≤ 0,1 o norepinefrina, ≤ 0,1	Dopamina en dosis > 15 o epinefrina > 0,1 o norepinefrina > 0,1
Tensión arterial					
Sistema nervioso central	15	13-14	10-12	6-9	<6
Escala de Glasgow					
Renal	<1,2	1,2-1,9	2,0-3,4	3,5-4,9	>5
Creatinina (mg/dL) o flujo urinario (mL/d)				<500	<200